

КОЛОНОСКОПИЯ

ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТ «ЭЗИКЛЕН» + СИМЕТИКОН

I этап приема «ЭЗИКЛЕНА» — за день до исследования:

- 18:00–19:00 — принять 0,5 литра раствора «ЭЗИКЛЕНА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 19:00–9:30 — принять 1 литр обычной воды (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 20:00 — принять симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки).

II этап приема «ЭЗИКЛЕНА» – в день исследования (если исследование после 10:30):

- 6:00–7:00 — принять 0,5 литра раствора «ЭЗИКЛЕНА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 7:00–8:00 — принять 1 литр обычной воды (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 7:30 — принять симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки);
- за 15 минут до процедуры — принять симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки).

ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТ «МОВИПРЕП» + СИМЕТИКОН

I этап приема «МОВИПРЕПА» — за день до исследования:

- 18:00–19:00 — принять 1 литр раствора «МОВИПРЕПА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 19:00–19:30 — принять 0,5 литра обычной воды (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 20:00 — принять «Эспумизан» в сиропе, 3 дозы (ложки).

II этап приема «МОВИПРЕП» – в день исследования (если исследование в 10:30):

- 6:00–7:00 — принять 1 литр раствора «МОВИПРЕПА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 7:00–8:00 — принять 0,5 литра обычной воды (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 7:30 — принять симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки);

КОЛОНОСКОПИЯ

- за 15 минут до процедуры — симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки).

ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТ «ФОРТРАНС» + СИМЕТИКОН

I этап приема «ФОРТРАНСА» — за день до исследования:

- 18:00–20:00 — принять 2 литра раствора «ФОРТРАНСА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 20:00 — принять «Эспумизан» сироп 3 дозы (ложки).

II этап приема «ФОРТРАНСА» — в день исследования (если исследование в 10:30):

- 6:00–8:00 — принять 2 литра раствора «ФОРТРАНСА» (по 1 стакану каждые 15 минут);
- 8:00 — принять симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки);
- за 15 минут до процедуры — симетикон в сиропе, 3 дозы (ложки).